



MI

ESPÍRITU

MI

FORTALEZA

Permanecer fuerte en la lucha contra el cáncer de mama metastásico

Entender su tratamiento con IXEMPRA® (ixabepilone)

IXEMPRA es un medicamento recetado que se usa para tratar el cáncer de mama localmente avanzado o metastásico cuando otros medicamentos no han funcionado o ya no funcionan. IXEMPRA se puede usar solo o con otro medicamento para el cáncer denominado Xeloda® (capecitabine).

Información de seguridad

IXEMPRA no debe usarse con Xeloda si usted tiene problemas hepáticos. Si tiene problemas hepáticos, recibir estos medicamentos juntos aumenta su probabilidad de infección grave y de muerte.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**. Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Asuma un rol activo en su cuidado

Este folleto le ayudará a saber qué esperar del tratamiento con IXEMPRA® (ixabepilone). Para aprovechar al máximo su tratamiento con IXEMPRA:

- Permanezca en contacto con su equipo de atención médica.
- Infórmeles cómo se siente.
- Hable con ellos sobre cualquier efecto secundario que pueda experimentar.
- Pregunte qué puede hacer que le ayude para seguir con el tratamiento.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

3 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



La información en este folleto no sustituye las instrucciones de su médico. Siempre siga el consejo de su médico sobre cómo y cuándo usar IXEMPRA® (ixabepilone) y cómo manejar los efectos secundarios.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

4 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



6 | Información
para el paciente



15 | Efectos
secundarios
graves



18 | Efectos
secundarios
frecuentes



32 | Información
de seguridad
importante



34 | Herramienta
de seguimiento
de efectos
secundarios



35 | Apoyo al
paciente



36 | Recursos

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

5 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Información para el paciente

Kit IXEMPRA® (ixabepilone) para inyección, solamente para infusión intravenosa

Lea la Información para el paciente que viene con IXEMPRA antes de comenzar a recibirlo y antes de cada inyección. Puede haber nueva información. Este folleto no reemplaza la conversación con su proveedor de atención médica sobre su afección médica o su tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de IXEMPRA?

Su proveedor de atención debe realizarle análisis de sangre para verificar la función del hígado:

- antes de comenzar a recibir IXEMPRA;
- según sea necesario mientras está recibiendo IXEMPRA.

Si los análisis de sangre muestran que tiene problemas hepáticos, no reciba las inyecciones de IXEMPRA junto con capecitabine. Si tiene problemas hepáticos, recibir estos dos medicamentos juntos aumenta su probabilidad de experimentar problemas graves. Estos incluyen: infección grave y la muerte debido a un recuento muy bajo de glóbulos blancos (neutropenia).

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

6 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

¿Qué es IXEMPRA® (ixabepilone)?

IXEMPRA es un medicamento para el cáncer. IXEMPRA se usa solo o con otro medicamento para el cáncer denominado capecitabine. IXEMPRA se usa para tratar el cáncer de mama, cuando algunos otros medicamentos no han funcionado o ya no funcionan.

¿Quién no debe recibir IXEMPRA?

No reciba inyecciones de IXEMPRA si usted:

- Es alérgica a un medicamento como TAXOL®, que contiene Cremophor® EL o aceite de castor polioxetilado.
- Tiene recuentos bajos de glóbulos blancos o plaquetas. Su proveedor de atención médica verificará sus recuentos sanguíneos.
- También está recibiendo un medicamento para el cáncer denominado capecitabine y tiene problemas hepáticos. **Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de IXEMPRA?”**

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Información para el paciente (continuación)

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir IXEMPRA® (ixabepilone)?

Es posible que IXEMPRA no sea adecuado para usted. Antes de recibir IXEMPRA, hable con su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas que incluyen si usted:

- Tiene problemas hepáticos.
- Tiene problemas cardíacos o antecedentes de problemas cardíacos.
- Ha tenido una reacción alérgica a IXEMPRA. Recibirá medicamentos antes de cada inyección de IXEMPRA para reducir la probabilidad de una reacción alérgica. **Consulte “¿Cómo recibiré IXEMPRA?”**
- Está embarazada o planea estarlo. No debe recibir IXEMPRA durante el embarazo porque puede dañar a su bebé en gestación. Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo evitar el embarazo mientras recibe IXEMPRA. Hable de inmediato con su proveedor de atención médica si queda embarazada o piensa que está embarazada mientras recibe IXEMPRA.
- Está amamantando. Se desconoce si IXEMPRA pasa a la leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si recibirá IXEMPRA o amamantará. No debe hacer ambas cosas.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos con receta y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

IXEMPRA y algunos otros medicamentos pueden interactuar entre sí y causar efectos secundarios. IXEMPRA puede afectar la forma en la que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar el modo en el que actúa IXEMPRA. Conozca los medicamentos que usa. Lleve una lista de sus medicamentos para mostrarle a su proveedor de atención médica.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

8 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

¿Cómo recibiré IXEMPRA® (ixabepilone)?

IXEMPRA se administra mediante una inyección directamente en la vena (infusión intravenosa). IXEMPRA se administra generalmente una vez cada tres semanas. Cada tratamiento con IXEMPRA durará unas 3 horas.

Su proveedor de atención médica decidirá la cantidad de IXEMPRA que usted recibirá y la frecuencia con la que lo recibirá.

Para reducir la probabilidad de una reacción alérgica, recibirá otros medicamentos aproximadamente 1 hora antes de cada tratamiento con IXEMPRA. **Consulte “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IXEMPRA?”**

Si tiene una reacción alérgica a IXEMPRA, recibirá un medicamento esteroide antes de futuras dosis de IXEMPRA. Es posible que también necesite recibir sus dosis de IXEMPRA más lentamente.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Información para el paciente (continuación)

¿Qué debo evitar mientras recibo IXEMPRA® (ixabepilone)?

IXEMPRA contiene alcohol. Si tiene mareos o somnolencia, evite actividades que pueden ser peligrosas, como conducir u operar maquinaria.

No beba jugo de pomelo mientras recibe IXEMPRA. Beber jugo de pomelo puede generar demasiada cantidad de IXEMPRA en la sangre y provocar efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IXEMPRA?

IXEMPRA puede provocar efectos secundarios graves que incluyen:

- **Entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos o los pies al recibir IXEMPRA (neuropatía).** Estos síntomas pueden ser nuevos o empeorar mientras recibe IXEMPRA. Con frecuencia, estos síntomas ocurren tempranamente durante el tratamiento con IXEMPRA. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de estos síntomas. Es posible que haya que disminuir o interrumpir su dosis de IXEMPRA hasta que sus síntomas mejoren o interrumpirlo totalmente.
- **Bajo recuento de glóbulos blancos (neutropenia).** Los glóbulos blancos ayudan a proteger el cuerpo de infecciones causadas por bacterias. Si desarrolla fiebre o una infección cuando sus glóbulos blancos están muy bajos, puede enfermarse de gravedad y morir. Es posible que necesite tratamiento con antibióticos en el hospital. Con frecuencia, su proveedor de atención médica controlará su recuento de glóbulos blancos mediante análisis de sangre. Hable de inmediato con su proveedor de atención médica o acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene fiebre (temperatura por encima de 100,5° F) u otro signo de infección, como escalofríos, tos, ardor o dolor al orinar, en cualquier momento entre tratamientos con IXEMPRA.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

10 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

-
- **Reacciones alérgicas.** Pueden ocurrir reacciones alérgicas severas con IXEMPRA® (ixabepilone) y causar la muerte en casos raros. Es más probable que las reacciones alérgicas ocurran mientras IXEMPRA se inyecta en la vena. Hable de inmediato con su proveedor de atención médica si experimenta alguno de los siguientes signos y síntomas de una reacción alérgica:
 - picazón, urticaria (ronchas elevadas que pican), sarpullido;
 - rubor facial;
 - hinchazón repentina de la cara, la garganta o la lengua;
 - opresión en el pecho, dificultad para respirar;
 - sensación de mareo o desmayo;
 - sentir los latidos del corazón (palpitaciones).
 - **Daño a un bebé en gestación. Consulte “¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir IXEMPRA?”**
 - **Problemas cardíacos.** IXEMPRA podría causar una disminución del flujo sanguíneo al corazón, problemas en la función cardíaca y latidos cardíacos anormales. Esto se observa con mayor frecuencia en pacientes que también reciben capecitabine. **Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta alguno de estos síntomas:**
 - dolor torácico;
 - dificultad para respirar;
 - sentir los latidos del corazón (palpitaciones);
 - aumento de peso inusual.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

11 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Información para el paciente (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes con IXEMPRA® (ixabepilone) usado solo, o con capecitabine pueden incluir:

- cansancio;
- pérdida del apetito;
- trastornos de las uñas de manos y pies;
- pérdida de cabello;
- fiebre;
- disminución de los glóbulos rojos (anemia);
- dolor en las articulaciones y los músculos;
- dolor de cabeza;
- disminución de las plaquetas (trombocitopenia);
- náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal;
- llagas en los labios, la boca y el esófago;
- sensibilidad y enrojecimiento en las palmas de las manos y las plantas de los pies (síndrome mano-pie) con aspecto de quemaduras solares; es probable que la piel se seque y se descame. También se puede experimentar entumecimiento y hormigueo.

Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios de IXEMPRA. Solicite más información a su proveedor de atención médica o farmacéutico si tiene preguntas o inquietudes.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

12 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Información general sobre IXEMPRA® (ixabepilone)

La información para el paciente en las páginas 6-13, resume la información más importante sobre IXEMPRA. A veces, los medicamentos se recetan para propósitos distintos de los mencionados en un Folleto de información para el paciente. Si desea obtener más información sobre IXEMPRA, hable con su proveedor de atención médica. Puede consultar a su proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener información acerca de IXEMPRA que está dirigida a los profesionales de atención médica. Para obtener más información sobre IXEMPRA, llame al 1-888-IXEMPRA (1-888-493-6772).

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

13 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Sepa cuándo hablar con su equipo de atención médica

Es posible que le resulte útil obtener más información sobre los posibles efectos secundarios de IXEMPRA® (ixabepilone) detallados en este folleto. Recuerde: cada persona es diferente. Es posible que no experimente todos los efectos secundarios detallados en las siguientes páginas. O puede tener otros efectos secundarios no detallados aquí. Y la duración de determinados efectos secundarios puede ser diferente para usted que para otra persona que recibe el mismo medicamento.

Informe a su médico o enfermera sobre cualquier efecto secundario que le moleste. También hable con su proveedor de atención médica sobre los consejos en este folleto. Si experimenta efectos secundarios, su médico puede disminuir su dosis. Puede interrumpir su tratamiento con IXEMPRA por un tiempo o totalmente. Si tiene preguntas, comuníquese con su médico o enfermera.

Consulte las páginas 15-31 sobre posibles efectos secundarios y consejos útiles.

Consulte la página 34 para obtener información sobre una herramienta que puede usar para llevar un seguimiento de sus efectos secundarios y compartir con su médico o enfermero.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido **el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

14 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Efectos secundarios graves

Neuropatía periférica (hormigueo, entumecimiento o ardor en las manos o los pies, o estar muy sensible al tacto)

La neuropatía periférica (peripheral neuropathy, PN) es una sensación desagradable en las manos o los pies causada por daño en los nervios. Podría experimentar entumecimiento, hormigueo, ardor o un dolor agudo. O podría estar muy sensible al tacto. Estos síntomas pueden derivar en problemas como debilidad, equilibrio deficiente y dificultad para caminar.

Con frecuencia, estos síntomas se manifiestan tempranamente en el tratamiento y pueden agravarse. Informe a su proveedor de atención médica tan pronto note estos síntomas. Dígale si se ha tornado difícil realizar las tareas diarias. Algunos ejemplos son atarse los cordones de los zapatos, abotonarse la camisa o lavar los platos.

Es posible que haya que disminuir su dosis de IXEMPRA® (ixabepilone) o interrumpir el medicamento hasta que estos síntomas mejoren. O puede necesitar interrumpir IXEMPRA de forma permanente. Asegúrese de seguir el consejo de su proveedor de atención médica sobre las maneras de manejar la PN.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 67 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron PN.
- En otro ensayo, el 63 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron PN.



Consejos para intentar poner en práctica

- Use zapatos con suelas de goma dentro y fuera de su casa.
- Use guantes cuando trabaje en el jardín, cocine o lave los platos.
- Antes de tomar un baño o una ducha, pruebe el agua con un termómetro o pídale a alguien que lo haga por usted.
- Tenga cuidado cuando manipule objetos afilados como tijeras y cuchillos.
- Quite las alfombras pequeñas y use felpudos antideslizantes y pasamanos.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

15 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Efectos secundarios graves (continuación)

Neutropenia (bajo recuento de glóbulos blancos)

Si tiene un recuento bajo de glóbulos blancos, su cuerpo no puede compartir muy bien las infecciones. Esto significa que puede tener una mayor probabilidad de enfermarse. Los signos de infección pueden incluir fiebre (temperatura superior a 100,5° F), escalofríos y tos. También puede incluir ardor o dolor al orinar. Si desarrolla una infección cuando sus glóbulos blancos están muy bajos, podría enfermarse de gravedad y morir. Es posible que necesite tratamiento con antibióticos en el hospital.

Con frecuencia, su proveedor de atención médica controlará su recuento de glóbulos blancos mediante análisis de sangre. Hable de inmediato con su médico o enfermera o acuda a la sala de emergencias más cercana si experimenta signos de infección. No reciba ninguna vacuna sin consultar primero con su equipo de atención médica. Algunas vacunas contienen virus vivos que pueden enfermarla.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 68 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda tuvieron un recuento muy bajo de glóbulos blancos.
- El 11 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron un recuento muy bajo de glóbulos blancos.
- En otro ensayo, el 54 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron un recuento muy bajo de glóbulos blancos.



Consejos para intentar poner en práctica

- Aléjese de las personas que estén enfermas, personas con resfríos, gripe, sarampión o varicela.
- Tenga cuidado de no rasguñarse o cortarse.
- Use afeitadora eléctrica y tenga cuidado al usar tijeras, agujas o cuchillos.
- Limpie las heridas de inmediato con agua tibia, jabón y un antiséptico.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

16 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Reacciones alérgicas

Algunas personas que reciben IXEMPRA® (ixabepilone) experimentan una reacción alérgica a él. Estas reacciones pueden ser severas en algunos casos y pueden causar la muerte en casos raros. Un proveedor de atención médica la controlará mientras esté recibiendo una dosis de IXEMPRA.

Debe saber lo siguiente:

- Recibirá otros medicamentos mediante inyección aproximadamente 1 hora antes de cada tratamiento con IXEMPRA.
- Estos medicamentos ayudan a disminuir su probabilidad de experimentar una reacción alérgica a IXEMPRA.
- Si desarrolla una reacción alérgica, es probable que ocurra mientras IXEMPRA se inyecta en la vena.

Esté atenta a estos síntomas frecuentes de una reacción alérgica:

- picazón, urticaria (ronchas elevadas que pican), sarpullido;
- rubor facial (enrojecimiento);
- hinchazón repentina de la cara, la garganta o la lengua;
- sensación de opresión en el pecho o dificultad para respirar;
- sensación de mareo o de que podría desmayarse;
- sentir el corazón latir con rapidez (palpitaciones).

Informe a su médico o enfermera de inmediato si experimenta síntomas de una reacción alérgica durante el tratamiento. Una vez que esté en casa después del tratamiento, llame a su proveedor de atención médica si comienza a desarrollar una reacción alérgica. Si tiene una reacción alérgica, recibirá otro medicamento (un esteroide) antes de cada dosis de IXEMPRA en el futuro. También es posible que reciba la dosis más lentamente.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

17 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Efectos secundarios frecuentes

Fatiga (cansancio)

El cansancio es bastante frecuente con el cáncer. Es distinto del cansancio que puede tener de la vida diaria. El descanso no hace desaparecer el cansancio provocado por el cáncer. Es posible que se sienta exhausta aunque realice muy poca actividad. El tratamiento con IXEMPRA® (ixabepilone) también puede causar cansancio.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 60 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron cansancio.
- El 29 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron cansancio.
- En otro ensayo, el 56 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron cansancio.



Consejos para intentar poner en práctica

- El cansancio puede ser causado por más de un problema. Hable con sus proveedores de atención médica. Pueden sugerir distintas cosas para ayudar al respecto. Estas incluyen: ejercicio, manejo del estrés, tratamiento de los problemas del sueño y mejora de la dieta.
- Trate de ir a su ritmo. Ahorre su energía para todo aquello que sea lo más importante para usted. Deje que otros la ayuden a hacer las compras, cocinar y conducir.
- Distráigase escuchando música, leyendo un libro o visitando amigos.
- Pregunte a su proveedor de atención médica sobre el ejercicio. La investigación demuestra que la cantidad, el tipo y el tiempo de ejercicio adecuados puede ayudar a disminuir el cansancio. También puede ayudarle a dormir mejor.
- Realice caminatas cortas. Para algunas personas, estar activas puede ayudar más que el descanso. Su proveedor de atención médica puede sugerir otras maneras de estar más activa.
- Duerma al menos 8 horas por noche, aunque no esté acostumbrada a hacerlo. Su cuerpo puede necesitar más sueño que antes del comienzo de la quimioterapia.
- Lleve un registro de cómo se siente. Esto puede ayudar a planificar sus actividades del día.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

18 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Pérdida del apetito/cambio en el sentido del gusto

IXEMPRA® (ixabepilone) puede afectar su apetito. Es posible que no tenga ganas de comer por distintos motivos. Algunos motivos pueden incluir un cambio en el sentido del gusto o el olfato, náuseas, dolor o depresión.



Ensayos clínicos

Pérdida del apetito

- En un ensayo, el 34 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron pérdida del apetito.
- El 15 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron pérdida del apetito.
- En otro ensayo, el 19 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron pérdida del apetito.

Cambio en el sentido del gusto

- En un ensayo, el 12 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron un cambio en el sentido del gusto.
- El 4 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron un cambio en el sentido del gusto.
- En otro ensayo, el 6 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron un cambio en el sentido del gusto.



Consejos para intentar poner en práctica

- Tome comidas o refrigerios pequeños con frecuencia en lugar de 3 comidas grandes.
- Tome alimentos y bebidas con alto contenido de calorías y proteínas cuando tenga ganas de comer. Algunos ejemplos incluyen pollo, helado, manteca de maní y batidos con leche. Si tiene diarrea o estreñimiento, es posible que deba tener cuidado respecto de los alimentos que coma. Hable con su proveedor de atención médica sobre lo que debe comer.
- Realice una caminata breve antes de las comidas para aumentar su apetito.
- Tome comidas líquidas como batidos (smoothies), jugos, sopa o bebidas nutritivas.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

19 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Efectos secundarios frecuentes (continuación)

Problemas en las uñas de los pies y las manos

Con IXEMPRA® (ixabepilone), las uñas pueden volverse oscuras o amarillas, o tornarse frágiles y romperse. A veces, las uñas se caen.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 24 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron problemas en las uñas.
- El 10 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron problemas en las uñas.
- En otro ensayo, el 9 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron problemas en las uñas.



Consejos para intentar poner en práctica

- Use guantes cuando lave los platos, haga tareas de jardinería o limpie la casa.
- Use un fortalecedor de uñas. Para uñas frágiles o quebradizas, use productos que usted pueda aplicar en las uñas para fortalecerlas.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

20 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Pérdida de cabello

IXEMPRA® (ixabepilone) puede dañar las células que hacen que el cabello crezca. La pérdida del cabello/vello puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 31 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron pérdida del cabello.
- El 3 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron pérdida del cabello.
- En otro ensayo, el 48 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron pérdida del cabello.



Consejos para intentar poner en práctica

- Considere cortarse el cabello. Esto puede ayudar a adaptarse a los cambios físicos y emocionales que ocurren con la pérdida del cabello.
- Considere comprarse una peluca mientras aún tenga cabello para que combine el color y el estilo con su propio cabello. Averigüe si su seguro cubre el costo de una peluca (puede denominarse prótesis capilar).

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

21 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Efectos secundarios frecuentes (continuación)

Fiebre

Llame de inmediato a su médico o enfermera si tiene una temperatura de 100,5°F o superior. Esto puede ser un signo de infección. Cuando sus glóbulos blancos están muy bajos, podría enfermarse de gravedad y morir. Es posible que necesite tratamiento con antibióticos en el hospital. Con frecuencia, su proveedor de atención médica controlará su recuento de glóbulos blancos mediante análisis de sangre.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 10 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda tuvieron fiebre.
- El 4 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron fiebre.
- En otro ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron fiebre.



Consejos para intentar poner en práctica

- Beba muchos líquidos como sopa, jugo o agua, o coma helados en palito.
- Si siente calor o frío, tómese la temperatura cada 2 o 3 horas y registre las lecturas.
- Comparta esta información con su médico o enfermera.
- Colóquese una compresa fría en la frente si siente calor.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

22 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Anemia (bajo recuento de glóbulos rojos)

Con pocos glóbulos rojos, es probable que su cuerpo no obtenga suficiente oxígeno. Esto puede generarle cansancio. También puede experimentar dificultad para respirar y sentir mareos. Estos son síntomas frecuentes de un recuento bajo de glóbulos rojos. También pueden ser síntomas de un efecto secundario grave. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su proveedor de atención médica de inmediato.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 10 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda tuvieron un nivel muy bajo de glóbulos rojos.
- El 5 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo, tuvieron un nivel muy bajo de glóbulos rojos.
- En otro ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo, tuvieron un nivel muy bajo de glóbulos rojos.



Consejos para intentar poner en práctica

- Póngase de pie lentamente después de estar recostada. Esto puede evitar que se sienta mareada o se desmaye.
- Descanse lo suficiente. Trate de dormir al menos 8 horas todas las noches.
- Coma los alimentos adecuados. Necesita suficientes calorías para mantener su peso. También necesita suficientes proteínas para ayudar al cuerpo a sanarse. Permita que su dietista o proveedor de atención médica la ayuden a planificar un menú saludable.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

23 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Efectos secundarios frecuentes (continuación)

Mialgia/atralgia (dolor en los músculos y las articulaciones)

IXEMPRA® (ixabepilone) puede causar problemas en los músculos y las articulaciones tal como debilidad, cansancio o dolor. Es posible que tenga dolor en un área pequeña o grande del cuerpo. El dolor puede ser leve o severo, sordo o punzante, constante o pasajero. Puede resultar difícil para usted hacer las cosas que está acostumbrada a hacer.

Asegúrese de hablar con su proveedor de atención médica si tiene dolor.

- Describa el dolor en detalle. ¿Dónde está el dolor? ¿Se manifiesta por todo el cuerpo o solo en una parte? ¿Qué tan fuerte es el dolor y cuánto dura?
- Su equipo de atención médica puede ofrecer maneras de manejar el dolor. Asegúrese de informar a su médico o enfermera si el dolor cambia durante el tratamiento con IXEMPRA.
- Es posible que desee llevar un diario del dolor para compartir con sus proveedores de atención médica. Cuanto más sepan sobre su dolor, mejor pueden ayudar a manejarlo.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 39 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron dolor en los músculos y las articulaciones.
- El 5 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron dolor en los músculos y las articulaciones.
- En otro ensayo, el 49 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron dolor en los músculos y las articulaciones.



Consejos para intentar poner en práctica

- Colóquese una compresa tibia sobre los músculos doloridos.
- Tome baños tibios para ayudar a aliviar los dolores musculares. Asegúrese de que el agua no esté demasiado caliente.
- Use bolsas calientes o una almohadilla térmica. Asegúrese de que la almohadilla térmica no esté demasiado caliente. No ponga la almohadilla térmica directamente sobre la piel. No se quede dormida con una almohadilla térmica puesta.
- Distráigase. Intente respirar profundamente, haga yoga, meditación, vea televisión o escuche música. Visite a familiares y amigos, o encuentre otras maneras de relajarse. Esto puede ayudarle a disminuir la tensión muscular, la ansiedad y el dolor.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

24 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Dolores de cabeza

IXEMPRA® (ixabepilone) puede causar dolores de cabeza.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron dolores de cabeza.
- El 3 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron dolores de cabeza.
- En otro ensayo, el 11 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron dolores de cabeza.



Consejos para intentar poner en práctica

- Practique ejercicios de relajación a modo de ayuda para estar menos tensa. Intente respirar profundamente o imagine un lugar tranquilo.
- Distráigase con música. Escuche música lenta y calma.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

25 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Efectos secundarios frecuentes (continuación)

Trombocitopenia (bajo recuento de plaquetas)

Las plaquetas ayudan en el proceso de coagulación de la sangre cuando usted sangra. Cuando usted no tiene suficiente cantidad de plaquetas, es posible que tenga sangrados nasales, un sarpullido con pequeños puntos rojos o moretones violetas, aunque no se haya golpeado con algo.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda tuvieron un recuento muy bajo de plaquetas.
- El 4 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvo un nivel muy bajo de plaquetas.
- En otro ensayo, el 7 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron un nivel muy bajo de plaquetas.



Consejos para intentar poner en práctica

- Suénese suavemente la nariz.
- Aplique una presión ligera en cualquier herida hasta que el sangrado se detenga.
- Use un cepillo de dientes muy blando. Antes de cepillarse, deje correr agua caliente sobre las cerdas para que se ablanden.
- Evite usar hilo dental y mondadientes. Hable con su proveedor de atención médica sobre las maneras de cuidar la boca y los dientes durante el tratamiento.
- Use una afeitadora eléctrica. No use una cuchilla de afeitar.
- Tenga cuidado cuando esté en actividad. Elija actividades que tengan menos probabilidad de generar lesiones.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

26 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Náuseas y vómitos

Con IXEMPRA® (ixabepilone) puede sentir náuseas (malestar estomacal) o vómitos. También puede tener arcadas, es decir cuando el cuerpo trata de vomitar, pero no puede porque el estómago está vacío. Las náuseas y los vómitos pueden ocurrir durante el tratamiento, justo de después de recibirlo o muchas horas o días después.

Sepa a quién y cuándo debe llamar si tiene náuseas y vómitos. Su proveedor de atención médica puede sugerir maneras de ayudar a controlar las náuseas causadas por su tratamiento. Cuando se controlan las náuseas, es menos probable que vomite. Su médico o enfermera pueden sugerir cómo controlar o detener las náuseas.



Ensayos clínicos

Náuseas

- En un ensayo, el 53 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron náuseas.
- El 40 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron náuseas.
- En otro ensayo, el 42 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron náuseas.

Vómitos

- En un ensayo, el 39 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron vómitos.
- El 24 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron vómitos.
- En otro ensayo, el 29% de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron vómitos.



Consejos para intentar poner en práctica

- Tome 5 o 6 comidas pequeñas y refrigerios cada día en lugar de 3 comidas grandes.
- Trate de evitar cocinar o estar cerca de los alimentos con olores fuertes como el café, el pescado, las cebollas y el ajo.
- Chupe cubitos de hielo o trate de morder pequeños bocados de helados en palito o cubitos con fruta.
- Intente respirar profundamente, meditar o pensar en escenas tranquilas.
- Coma cuando sea adecuado para usted. Algunas personas se sienten mejor cuando comen antes del tratamiento. Otras personas se sienten mejor cuando reciben el tratamiento con el estómago vacío. Decida lo que mejor funcione para usted.
- Coma una dieta de blandos y fáciles de digerir. Esto podría incluir caldo claro, jugo de arándanos, pollo asado o al horno sin la piel, avena instantánea, tostadas de pan blanco, galletas saladas, fideos (noodles), gelatina, frutas enlatadas y nieves o sorbetes.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

27 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Efectos secundarios frecuentes (continuación)

Diarrea

La diarrea puede desarrollarse cuando IXEMPRA® (ixabepilone) daña las células sanas que recubren los intestinos. Hable con su proveedor de atención médica si su diarrea dura más de 24 horas o si tiene dolor o calambres.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 44 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron diarrea.
- El 39 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron diarrea.
- En otro ensayo, el 22 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron diarrea.



Consejos para intentar poner en práctica

- Beba al menos 8 tazas de líquido todos los días para estar hidratada.
- Elija agua, caldo claro o bebidas deportivas. Tenga sus bebidas a temperatura ambiente.
- Coma alimentos con bajo contenido de fibra. Los alimentos con alto contenido de fibra pueden empeorar la diarrea.
- Intente comer pollo o pavo sin piel, huevos, queso cottage, arroz blanco, papas sin cáscara, bananas, jugo claro, fruta enlatada, gelatina, galletas saladas y nieves o sorbetes.
- Coma alimentos con alto contenido de sodio y potasio para reemplazar lo que pueda perder con una diarrea. Los ejemplos son: bananas, naranjas, néctar de durazno o damasco y papas hervidas o en puré.
- Evite el alcohol, la cafeína (café, té, cola, chocolate) y productos lácteos. También evite los alimentos picantes, grasosos o fritos.
- Evite el jugo de pomelo mientras recibe IXEMPRA. Beber jugo de pomelo puede generar demasiada cantidad de IXEMPRA en la sangre. Esto podría ocasionar efectos secundarios.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

28 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Estreñimiento

IXEMPRA® (ixabepilone) puede causar estreñimiento. Puede tener gases, calambres o una sensación de hinchazón o náuseas. Hable con su médico o enfermera si tiene menos deposiciones de lo normal. Su proveedor de atención médica puede sugerir maneras de tratar el estreñimiento.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 22 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron estreñimiento.
- El 6 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron estreñimiento.
- En otro ensayo, el 16 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron estreñimiento.



Consejos para intentar poner en práctica

- Beba al menos 8 tazas de agua u otros líquidos todos los días. Las bebidas que pueden ayudar con el estreñimiento incluyen café o té tibio o caliente, o jugo de ciruela pasa.
- Evite el jugo de pomelo mientras recibe IXEMPRA. Beber jugo de pomelo puede generar demasiada cantidad de IXEMPRA en la sangre. Esto podría ocasionar efectos secundarios.
- Coma alimentos ricos en fibras para ayudar a ablandar las heces. Elija alimentos como verduras crudas o cocidas, arvejas y frijoles secos cocidos, panes integrales y cereales, arroz integral o salvaje, frutas secas, nueces y palomitas de maíz.
- Trate de estar activa todos los días. Pregunte a su médico o enfermera sobre el tipo y la cantidad de actividad que sea adecuada para usted. Puede sugerirle ejercicios con silla o en la cama, si es necesario.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

29 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Efectos secundarios frecuentes (continuación)

Estomatitis/mucositis (ampollas en los labios, la boca y el esófago)

El tratamiento con IXEMPRA® (ixabepilone) puede dañar las células de rápido crecimiento que recubren los labios, la boca y el esófago. Esto puede causarle llagas rojas y abiertas, y una mayor sensibilidad al calor y al frío.



Ensayos clínicos

- En un ensayo clínico, el 31 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron llagas en los labios, la boca y el esófago.
- El 20 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo, tuvieron llagas en los labios, la boca y el esófago.
- En otro ensayo, el 29 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo, tuvieron llagas en los labios, la boca y el esófago.



Consejos para intentar poner en práctica

- En una licuadora haga un puré con los alimentos cocinados para que sea más fácil comerlos.
- Límpiense los dientes con hisopos de algodón, si hacerlo con un cepillo de dientes resulta demasiado doloroso.
- Elija alimentos que pueda comer fríos o a temperatura ambiente si los alimentos calientes le lastiman la boca o la garganta.
- Evite comer alimentos que puedan lastimar la boca. Los ejemplos incluyen alimentos bruscos y crujientes, alimentos picantes, frutas o jugos cítricos (como naranja, limón y pomelo), comidas y bebidas con alto contenido de azúcar, bebidas alcohólicas y productos de tabaco.
- Use hilo dental con suavidad todos los días. Evite toda área que duela o sangre.
- Chupe cubitos de hielo o helados de palito para ayudar a calmar el dolor en la boca.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

30 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Síndrome mano-pie (sensibilidad y enrojecimiento en las manos y los pies)

Las palmas de las manos y las plantas de los pies pueden verse como quemadas por el sol y doler. En casos severos, la piel puede ampollarse y luego secarse y descamarse. También puede producirse una sensación de entumecimiento y hormigueo en la piel. Estos pueden ser signos de sensibilidad y enrojecimiento en las manos y los pies.



Ensayos clínicos

- En un ensayo, el 64 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda experimentaron sensibilidad y enrojecimiento en las manos y los pies.
- El 63 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo experimentaron sensibilidad y enrojecimiento en las manos y los pies.
- En otro ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo experimentaron sensibilidad y enrojecimiento en las manos y los pies.



Consejos para intentar poner en práctica

- Permanezca alejada del sol lo más posible.
- Aplique pantalla solar de al menos 30 SPF, como mínimo 1 a 2 horas antes de ir afuera. Use ropa de protección y un sombrero cuando esté afuera.
- Póngase insertos de gel en los zapatos si los pies están sensibles.
- Evite usar zapatos demasiado apretados.
- Báñese con agua tibia en lugar de agua caliente.
- Use un jabón suave o gel para baño que no tenga perfume, alcohol o colorantes.
- Use crema o loción humectante con frecuencia, pero aplíquela con suavidad para evitar frotar la piel.
- Elija una loción o crema sin perfumes ni alcohol.

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

31 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Información importante de seguridad sobre IXEMPRA® (ixabepilone)

Su proveedor de atención médica debe realizar análisis de sangre para verificar el funcionamiento del hígado antes de comenzar el tratamiento con IXEMPRA y según sea necesario durante el tratamiento. Si los análisis de sangre muestran que tiene problemas hepáticos, no reciba las inyecciones de IXEMPRA junto con capecitabine. Si tiene problemas hepáticos, recibir estos medicamentos juntos podría aumentar su probabilidad de infección grave o de muerte debido a un recuento muy bajo de glóbulos blancos (neutropenia).

No debe recibir su inyección de IXEMPRA si usted:

- Es alérgica a medicamentos que contienen Cremophor® EL* (aceite de castor polioxetilado).
- Tiene un recuento bajo de glóbulos blancos o de plaquetas.

Antes de recibir tratamiento con IXEMPRA, hable con su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidas cualquiera de las siguientes:

- Problemas hepáticos.
- Problemas cardíacos o antecedentes de problemas cardíacos.
- Una reacción alérgica a IXEMPRA. (Para reducir la probabilidad de una reacción alérgica, recibirá otros medicamentos aproximadamente 1 hora antes de cada dosis de IXEMPRA).
- Diabetes.
- Entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos o los pies (neuropatía).

[Haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa, incluido **el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

También debe informar a su proveedor de atención médica si usted:

- Está embarazada o planea estarlo. IXEMPRA puede dañar a un bebé en gestación.
- Está amamantando. Se desconoce si IXEMPRA pasa a la leche materna.
- Toma cualquier medicamento, incluidos medicamentos con o sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas, incluida la hierba de San Juan. IXEMPRA y algunos otros medicamentos pueden interactuar entre sí y causar efectos secundarios.

Mientras esté bajo tratamiento con IXEMPRA, debe evitar:

- Actividades que puedan ser peligrosas, como conducir u operar maquinaria porque IXEMPRA contiene alcohol y puede causar mareos y somnolencia (sentir cansancio).
- Beber jugo de pomelo. El jugo de pomelo puede generar demasiada cantidad de IXEMPRA en la sangre y provocar efectos secundarios.

IXEMPRA puede provocar efectos secundarios graves. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta cualquiera de los siguientes efectos mientras recibe IXEMPRA:

- **Entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos o los pies (neuropatía).** Con frecuencia, cuando estos síntomas ocurren, se manifiestan tempranamente en el tratamiento y pueden agravarse. Es posible que haya que disminuir su dosis de IXEMPRA, interrumpirla hasta que sus síntomas mejoren o interrumpirla totalmente.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

- **Bajo recuento de glóbulos blancos (neutropenia).** Los glóbulos blancos ayudan a proteger el cuerpo de infecciones causadas por bacterias. Los síntomas de neutropenia incluyen fiebre, (temperatura superior a 100,5 grados), escalofríos, tos y ardor o dolor al orinar. Si desarrolla fiebre o una infección cuando su recuento de glóbulos blancos es muy bajo, puede enfermarse de gravedad y morir. Es posible que necesite tratamiento con antibióticos en el hospital.
- **Reacciones alérgicas.** Los signos de una reacción alérgica incluyen picazón, urticaria, sarpullido, rubor facial, hinchazón repentina de la cara, la garganta o la lengua, opresión en el pecho, dificultad para respirar, sensación de mareo o desmayo, sentir los latidos del corazón (palpitaciones). Es más probable que las reacciones alérgicas ocurran mientras IXEMPRA® (ixabepilone) se inyecta. Pueden ocurrir reacciones alérgicas severas con IXEMPRA y que posiblemente causen la muerte en casos raros.
- **Problemas cardíacos.** Dolor torácico, dificultad para respirar, palpitaciones o aumento inusual de peso. Estos pueden ser causados por una disminución del flujo sanguíneo al corazón, problemas en la función cardíaca y latidos cardíacos anormales.
- **Los efectos secundarios más frecuentes de IXEMPRA cuando se usa solo con capecitabine, pueden incluir:**
 - cansancio;
 - pérdida del apetito;
 - problemas en las uñas de los pies y las manos;
 - pérdida de cabello;
 - fiebre;
 - disminución en el recuento de los glóbulos rojos (anemia);
 - dolor en las articulaciones y los músculos;
 - dolor de cabeza;
 - disminución en el recuento de plaquetas (trombocitopenia);
 - náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal;
 - llagas en los labios, la boca y el esófago;
 - sensibilidad y enrojecimiento en las palmas de las manos y las plantas de los pies (síndrome mano-pie). Puede verse como una quemadura de sol. La piel puede secarse y descamarse, o puede producirse una sensación de entumecimiento y hormigueo.

Si tiene alguna pregunta sobre su salud o sus medicamentos, hable con su proveedor de atención médica.

*Cremophor es una marca registrada de BASF AG.

Haga clic [aquí](#) para obtener Información de prescripción completa, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**



Seguimiento de sus efectos secundarios

Use esta herramienta de seguimiento de los efectos secundarios para registrar los efectos secundarios que experimente y el momento en que ocurran. Realice copias de esta herramienta de seguimiento para cada ciclo antes de escribir en ella a fin de continuar realizando el seguimiento de sus efectos secundarios. Comparta esta información con su médico en cada visita al consultorio.

Día 1	Día 8	Día 15
Día 2	Día 9	Día 16
Día 3	Día 10	Día 17
Día 4	Día 11	Día 18
Día 5	Día 12	Día 19
Día 6	Día 13	Día 20
Día 7	Día 14	Día 21

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado**.

34 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa



Apoyo al paciente



R-PHARM  US

ACCESS + SUPPORT™

Comprometido con los pacientes. Comprometido con el cuidado.

Programa de Acceso y soporte de R-Pharm US

Este programa ofrece los servicios a continuación que pueden ayudarla a obtener y pagar el tratamiento con IXEMPRA® (ixabepilone):

- ayudar con copagos;
- programa de asistencia al paciente (Patient assistance program, PAP);
- identificar los beneficios que usted tiene;
- enviar una solicitud de seguro;
- apelar reclamaciones.

Para obtener más información, llame al Centro de Apoyo al **1-855-991-7277**, de 8 a. m. a 8 p. m. hora del este, de lunes a viernes o visite rpharm-us.enrollsource.com.

@ Recursos

Vivir más allá del cáncer de mama (Living Beyond Breast Cancer). Proporciona programas y servicios para ayudar a las personas cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer de mama al brindar información, comunidad y apoyo en los que usted puede confiar; es de fácil acceso y respetuoso de usted y su situación. lbbc.org

Red del cáncer de mama metastásico (Metastatic Breast Cancer Network, MBCN). Una organización de defensa nacional, independiente, sin fines de lucro, formada exclusivamente por voluntarios, dirigida por pacientes y avocada a las inquietudes exclusivas de hombres y mujeres que viven con cáncer de mama metastásico, también conocido como cáncer de mama avanzado o en etapa IV. mbcn.org

Red nacional integral del cáncer (National Comprehensive Cancer Network, NCCN). Una alianza sin fines de lucro de 27 de los principales centros para el cáncer a nivel mundial, dedicada a mejorar la calidad, la efectividad y la eficacia de la atención proporcionada a pacientes con cáncer. nccn.com

Véase bien, siéntase mejor (Look Good Feel Better). Un grupo dedicado a mejorar la autoestima y la calidad de vida de las personas que se someten tratamientos para el cáncer. El objetivo del grupo es mejorar la autoimagen y el aspecto a través de sesiones de belleza grupales, individuales y de autoayuda de cortesía, que generan un sentido de apoyo, confianza, coraje y comunidad. lookgoodfeelbetter.org

Susan G. Komen. Proporciona una gran cantidad de información segura, precisa, actual y basada en la evidencia sobre el cáncer de mama, que ha sido desarrollada por expertos en cáncer de mama. Si desea saber más sobre algún tema, desde entender un diagnóstico a tratamientos, tipos de asistencia y apoyo, lo encontrará aquí. komen.org

Oncolink. Oncolink fue el primer sitio web de información sobre el cáncer en internet; comenzó en 1994 y continúa siendo uno de los más grandes. Este galardonado sitio es mantenido por un grupo de profesionales de atención oncológica que entienden las necesidades de los pacientes, los cuidadores y los profesionales de atención médica. oncolink.org

Breastcancer.org. Esta comunidad y sus juntas de debate cuentan con miembros registrados de todo el mundo. Puede registrarse para ser miembro o simplemente examinar las historias, el apoyo y la información que se ofrece. breastcancer.org

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

36 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Inspire. Un lugar seguro y protegido para pacientes y cuidadores para brindar apoyo y conectarse entre sí a través de comunidades de apoyo en salud y bienestar en línea. Únase a muchos otros que entienden por lo que usted está pasando y toman decisiones importantes sobre su salud. [inspire.com](https://www.inspire.com)

CaringBridge. Ya no más repetir la historia una y otra vez. Comuníquese con toda su familia y sus amigos al mismo tiempo, lo que le proporcionará el tiempo para centrarse en lo que realmente importa. Al crear un sitio web CaringBridge gratuito, las personas, en momentos de necesidad, pueden compartir actualizaciones, fotos y vídeos, conectándose con amigos y familiares a quienes les interesa y desean ayudar. [caringbridge.org](https://www.caringbridge.org)

METAvisor. Una organización liderada por voluntarios, sin fines de lucro que financia investigaciones vitales para ayudar a mejorar la longevidad y la calidad de vida para pacientes con cáncer de mama metastásico (metastatic breast cancer, mBC), centrando la atención pública en las urgentes necesidades de la comunidad de mBC, al ayudar a las pacientes a encontrar fortaleza a través del apoyo y el propósito, y al hacer que cada dólar sea importante para prolongar y mejorar la calidad de vida para los pacientes con mBC. [metavivor.com](https://www.metavivor.com)

Atención para el cáncer (CancerCare). Brinda asesoramiento telefónico, en línea y en persona, grupos de apoyo, educación, publicaciones y asistencia financiera y de copagos. Los trabajadores sociales profesionales en la atención oncológica ofrecen atención personalizada y todos los servicios son gratuitos. [cancer.org](https://www.cancer.org)

Comunidad de apoyo para el cáncer (Cancer Support Community). Servicios relacionados con las emociones y la educación para todas las personas afectadas por el cáncer. Este sitio web ofrece una variedad de información, herramientas y apoyo para ayudarle a hacer frente al impacto del cáncer. [cancersupportcommunity.org](https://www.cancersupportcommunity.org)

[Haga clic aquí](#) para obtener Información importante de seguridad, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.**

37 Además [haga clic aquí](#) para obtener Información de prescripción completa.

IXEMPRA[®]
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa

Visite IXEMPRA.com para obtener más información.

R-PHARM  US

El logotipo de R-Pharm US Access and Support es una marca de IXEMPRA® es marca registrada de R-Pharm US Operating LLC, una subsidiaria propiedad exclusiva de R-Pharm US LLC.

Xeloda es una marca registrada de Hoffmann-La Roche, Inc.

Taxol es una marca registrada de Bristol-Myers Squibb.

Cremophor es una marca registrada de BASF AG.

© 2016, R-PHARM US. Todos los derechos reservados. IXE-00100-e 07/16

IXEMPRA®
(ixabepilone) para inyección,
para infusión intravenosa